


ATLAS  
DE LA  
FLORE ALPINE.

Tome. v.


QK315

.C58

t.5









ATLAS  
DE LA  
FLORE ALPINE

---

*Publié par le Club alpin allemand  
et autrichien.*

---

**Tome V (Planches 401 à 500).**



LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

GENÈVE & BAILE  
LIBRAIRIE GEORG & C<sup>o</sup>

Lyon, même maison.

1899

Tous droits réservés.

QK315  
.058  
t.5


# Index des planches du tome V.

(Planches 401 à 500.)

LIBRARY  
NEW YORK  
BOTANICAL  
GARDEN

Les plantes dont les noms sont accompagnés d'un \* sont photographiées d'après nature.

401. *Globularia nudicaulis* L.  
402. *Calamintha alpina* Lam.  
403. *Horminum pyrenaicum* L.  
404. *Salvia glutinosa* L.\*  
405. *Dracocephalum Ruyschianum* L.  
406. *Scutellaria alpina* L.\*  
407. *Stachys alpina* L.\*  
408. » *alopecurosus* Benth.\*  
409. *Ajuga pyramidalis* L.  
410. *Plantago alpina* L.  
411. *Herniaria alpina* Vill.  
412. *Polygonum viviparum* L.\*  
413. *Rumex scutatus* L.  
414. » *alpinus* L.\*  
415. » *nivalis* Hegetschev.  
416. *Oxyria digyna* Campd.\*  
417. *Daphne alpina* L.\*  
418. » *striata* Tratt.\*  
419. *Hippophaë rhamnoides* L.\*  
420. *Thesium alpinum* L.\*  
421. *Alnus viridis* DC.\*  
422. *Salix herbacea* L.  
423. » *reticulata* L.\*  
424. » *retusa* L.\*  
425. » *Jacquini* Wild.\*  
426. *Empetrum nigrum* L.  
427. *Orchis maculata* L.\*  
428. » *sambucina* L.\*  
429. » *globosa* L.\*  
430. » *viridis* L.\*  
431. » *conopea* R. Br.\*  
432. » *albida* Scop.\*  
433. *Chamaeorchis alpina* Rich.\*  
434. *Nigritella nigra* Rich.\*  
435. *Platanthera bifolia* Rich.\*  
436. *Listera cordata* R. Br.\*  
437. *Corallorrhiza innata* R. Br.\*  
438. *Cypripedium Calceolus* L.\*  
439. *Crocus vernus* All.\*  
440. *Streptopus amplexifolius* DC.\*  
441. *Paradisica Liliastrum* Bertol.\*  
442. *Allium Victorialis* L.\*  
443. » *Schoenoprasum* L.\*  
444. *Lilium bulbiferum* L.\*  
445. » *Martagon* L.\*  
446. *Gagea Liottardi* Schult.  
447. *Erythronium Dens Canis* L.  
448. *Lloydia serotina* Salisb.\*  
449. *Tofieldia calyculata* Wahl.\*  
450. *Veratrum album* L.\*  
451. *Juncus Jacquini* L.  
452. » *triglumis* L.  
453. » *alpinus* Vill.  
454. » *Hostii* Tausch.\*  
455. *Luzula spicata* DC.\*  
456. » *flavescens* Gaud.\*  
457. » *lutea* DC.\*  
458. » *nivea* DC.\*  
459. *Heleocharis pauciflora* L.\*  
460. *Eriophorum Scheuchzeri* Hopp.\*  
461. » *atricum* Palla.\*  
462. » *alpinum* L.\*  
463. *Kobresia scirpina* Willd.\*  
464. » *caricina* Willd.\*  
465. *Carex atrata* L.\*  
466. » *capillaris* L.  
467. » *firma* Host.\*  
468. » *ferruginea* Scop.\*  
469. *Phleum alpinum* L.  
470. *Agrostis alpina* Scop.  
471. *Trisetum subspicatum* Beauv.\*  
472. » *alpestre* Beauv.\*  
473. *Avena versicolor* Vill.  
474. *Sesleria ovata* A. Kern.\*  
475. » *varia* Westst.\*  
476. » *disticha* Pers.\*  
477. *Köleria hirsuta* Gaud.\*  
478. *Poa alpina* L.\*  
479. » *cenisia* All.\*  
480. *Festuca pulchella* Schrad.\*  
481. » *pumila* Vill.\*  
482. » *Halleri* All.\*  
483. *Nardus stricta* L.\*  
484. *Pinus Cembra* L.\*  
485. » *montana* Mill.\*  
486. *Juniperus nana* Willd.\*  
487. » *sabina* L.\*  
488. *Taxus baccata* L.\*  
489. *Botrychium Lunaria* Sw.  
490. *Blechnum Spicant* Sm.\*  
491. *Asplenium viride* Huds.\*  
492. » *Seelosii* Leyb.  
493. *Aspidium Lonchitis* Sw.\*  
494. *Adiantum Capillus Veneris* L.\*  
495. *Cryptogramme crispa* R. Br.\*  
496. *Scolopendrium vulgare* Sm.  
497. *Cystopteris fragilis* Bernh.\*  
498. *Woodсия hyperborea* R. Br.  
499. *Lycopodium alpinum* L.\*  
500. » *Selaginelloides* L.\*





401. *Globularia nudicaulis*, L. — Nacktstengelige Kugelblume.  
 Globulaire à tiges nues. — Nudestemed Globularia.

Escarpements rocheux des Alpes calcaires dans la région alpine et sous alpine. Mai — Août.





402. *Calamintha alpina*, Lam. — Alpenquendel.

Calament des Alpes. — Alpine Calaminth.

Pâturages pierreux de la région alpine et sous alpine. Mai — Août.








403. *Horminum pyrenaicum*, L. — *Horminelle*.

*Horminelle des Pyrénées*. — *Pyrenean Horminelle*.

Alpes occidentales, orientales et méridionales, dans les pâturages de la région sous alpine et montagnaise.  
Juin — Août.





404. *Salvia glutinosa*, L. — Klebriger Salbei.  
Sauge visqueuse. — Viscous Sage.

Lieux pierreux de la région montagneuse et boisée. Juillet—Septembre.





405. *Dracocephalum ruyschianum*, L. — Ruysch's Drachenkopf.  
 Dracocéphale de Ruysch. — Ruysch's Dragon's Head.  
 Pentes sèches et gazonnées de la région sous alpine et montagneuse. Juin — Juillet.







406. *Scutellaria alpina*, L. — Alpen-Helmkraut.  
Toque des Alpes. — Alpine Skullcap.

Pentes pierreuses et arides de la région sous alpine et montagneuse. Juin - Août.





407. *Stachys alpina*, L. — Alpenziest.  
Epière des Alpes. — Alpine Woundwort.  
Pentes boisées de la région montagneuse et boisée. Juin — Août.





408. *Stachys alopecuroides*, Benth. — Fuchsschwanz-Ziest.

Epiaire Queue de Renard. — Foxtail Woundwood.


Alpes orientales occidentales et méridionales dans la région montagneuse. Juillet—Août.





409. *Ajuga pyramidalis*, L. — Pyramidengünsel.  
Bugle pyramidale. — Pyramidal Bugle.  
Pâturages et pentes gazonnées des Alpes. Mai — Juillet.







410. *Plantago alpina*, L. — Alpenwegerich.

Plantain des Alpes. — Alpine Plantain.

· Pâturages de la région alpine et sous-alpine. Juin — Juillet.





411. *Herniaria alpina*, Vill. — Alpen-Bruchkraut.

Herniaire des Alpes. — Alpine Herniaria.

Escarpements rocheux de la zone alpine et sous alpine. Juillet — Août.





412. *Polygonum viviparum*, L. — Knospknöterich.  
Renouée vivipare. — Vivipare Knottweed.

Prairies fraîches des Alpes. Mai—Août.







413. *Rumex scutatus*, L. — Schildampfer.

Oseille à écussons. — Scutate Dock.

Pierriers et lieux arides des Alpes. Mai — Juillet.





414. *Rumex alpinus*, L. — Alpenampfer, .  
Rhubarbe des Moines. — Alpine Dock.  
Pâturages gras de la région alpine près des chalets. Juin — Août.





415. *Rumex nivalis*, Hegetschw. — Schneeampfer.

Oseille des neiges. — Nival Dock.

Alpes occidentales et centrales, dans les éboulis de la région alpine et sous alpine. — Juillet—Août.





416. *Oxyria digyna*, Campd. — Säuerling.

Oseille glaciale. — Dock of the glaciers.

Fboulis et pierriers des hautes altitudes. Juillet—Août.







417. *Daphne alpina*, L. — Alpen-Seidelbast.

Daphné des Alpes. — Alpine Mezereon.

Rochers et éboulis calcaires de la région montagneuse. Mai — Juin.





418. *Daphne striata*, Tratt. — Gestreifter Seidelbast.  
Thymélée strié. — Striate Mezereon.

Alpes orientales et italiennes, pâturages rocheux de la région sous alpine et montagneuse





419. *Hippophaë rhamnoides*, L. — Sanddorn.  
Argousier. — Sea Buckthorn.  
Bords des torrents des Alpes. Avril—Mai.





420. *Thesium alpinum*, L. -- Alpen-Leinblatt.

Thésion des Alpes.

Prairies des Alpes. Mai — Août.







421. *Alnus viridis* DC. — Grünerle.

Aulne vert. — Green Alder.

Pentes humides de la région sous alpine et montagnaise. Avril — Juillet.





422. *Salix herbacea*, L. — Krautige Weide.

Saule herbacé. — Herbaceous Willow.

Pentes humides, lieux arides de la région alpine et sous alpine. Juillet—Août.





423. *Salix reticulata*, L. — Netznervige Weide.  
Saule réticulé. — Reticulated Willow.

Pentes humides des zones supérieures et de la région alpine. Juin — Août.





424. *Salix retusa*, L. — Gestutztblättrige Weide.  
Saule émoussé. — Retused Willow.

Pentes humides des zones supérieures et de la région alpine. Juin — Août.







G+

425. *Salix Jacquiniana*, Willd. — Jacquin's Weide.  
Saule de Jacquin. — Jacquin's Willow.

Pentes humides des Alpes orientales dans la région alpine et sousalpine. Juin - Juillet.





426. *Empetrum nigrum*, L. — Rauschbeere.  
Camarine. — Crowberry.


Lieux rocheux de la région alpine et sous alpine. Mai—Juillet.





427. *Orchis maculata*, L. — Geflecktes Knabenkraut.  
*Orchis maculé*. — Spotted Orchis.

Prairies et bois des régions inférieures et moyennes. Mai - Juillet.





428. *Orchis sambucina*, L. — Hollunderduftendes Knabenkraut.

*Orchis à odeur de Sureau.* — Elder Orchis.

Prairies pentes rocailleuses de la région sous alpine et montagnaise. Avril — Juillet.







429. *Orchis globosa*, L. — Kugelähriges Knabenkraut.

*Orchis globuleux*. — Globulose Orchis.

Prairies de la région alpine et sous alpine. Mai — Juillet.





430. *Orchis viridis*, L. — Hohlzunge.

*Orchis Grenouille*. — Frog Orchis.

Pâturages des hautes et des moyennes altitudes. Juin—Août.





431. *Orchis conopea*. — Mücken-Höswurz.  
Gymnadène à long éperon. — Fragrant orchis.  
Prairies de la région sous alpine et montagneuse. Mai—Août.





432. *Orchis albida*, Scop. — Weissblüthige Höswurz.  
Gymnadène blanchâtre. — White Gymnadenia.

Pentes buissonneuses et sèches, landes d'Ericacées dans la région alpine et sous alpine. Juillet — Août.







**433.** *Chamaeorchis alpina*, Rich. — Zwergstendel.

Faux Orchis. — False Orchis.

Disséminé dans la région alpine et sous alpine. Juillet — Août.





434. *Nigritella nigra*, Rich. — Kohlröschen.

Orchis Vanille. — Vanilla Orchis.

Pâturages secs de la région alpine et sous alpine. Mai—Août.





435. *Platanthera bifolia* Rich. — Zweiblättrige Kukuksblume.

Orchis à deux feuilles. — Butterfly Orchis.

Bois et prairies des régions inférieures. Mai — Juin.





436. *Listera cordata*, R. Br. — Herzblättriges Zweiblatt.

Listère à feuilles cordées. — Heartleaved Listera.

bois moussus, lieux frais et ombragés de la région sous alpine et montagnaise. Ici et là. Juin — Août.







437. *Corallorrhiza innata*, R. Br. — Korallenwurz.

Coralline des Bois. — Spurless Coralroot.

Bois des régions alpines et montagneuses; ici et là. Juin—Juillet.





438. *Cypripedium Calceolus*, L. — Frauenschuh.

Sabot de Vénus. — Lady's Slipper.

Disséminé, ici et là, dans la région inférieure. Mai — Juin.





439. *Crocus vernus*, All. — Weissblüthiger Safran.  
Safran des Alpes. — Alpine Crocus.

Prairies des Alpes. Mars—Juin.





440. *Streptopus amplexifolius*, DC. — Knotenfuss.  
Streptope faux muguet. — Alpine Salomon-Seal.

Disséminé dans la région alpine et sous alpine. Juin — Juillet.







441. *Paradisia Liliastrum*, Bertol. — Trichterlilie.  
Paradisie. — St. Bruno's Lily.

Prairies des Alpes occidentales, centrales et méridionales, dans la région sous alpine. Mai—Juillet.





442. *Allium victorialis*, L. — Allermannsharnisch.  
Herbe à neuf chemises. — Nine Tunics Wort.

Disséminé dans les rochers de la région sous-alpine. Juin — Août.





443. *Allium schoenoprasum*, L. — Sibirischer Lauch.  
Ail Branlettes. — Chives.

Prairies humides dans la région alpine et sous alpine. Juin - Août.





444. *Lilium bulbiferum*, L. — Feuerlilie.

Lys bulbifère. — Bulbiferous Lily.

Alpes orientales et occidentales dans les prairies de la région inférieure.







445. *Lilium Martagon*, L. — Türkenbund.

Lis Martagon. — Martagon Lily.

Prairies et lieux boisés des Alpes. Juin — Août.





446. *Gagea Liotardi*, Schult. — Liottardi's Goldstern.  
Gagée de Liotard. — Liotard's Gagea.

Alpes occidentales et centrales dans les pâturages gras et près des chalets. Mai — Juillet.





447. *Erythronium Dens Canis*, L. — Hundszahn.  
Dent de Chien. — Dog's tooth Violet.

Alpes occidentales et méridionales dans la région inférieure. Avril — Mai





448. *Lloydia serotina* Salisb. — Zwerglilie.

Loïdie des Alpes. — Lily of the Glaciers.

Escarpements rocheux et ombragés des régions supérieures. Juillet—Août.







449. *Tofieldia calyculata*, Wahlbg. — Simsenlilie.

Tofieldie à colerette. — Schottish Asphode.

Marécages et lieux humides des Alpes. Juin — Août.






450. *Veratrum album*, L. — Weißer Germer.  
Véraire blanc. — White Hellebore.

Pâturages et prairies de la chaîne alpine. Juin — Août.





451. *Juncus Jacquini*, L. — Jacquin's Simse.

Jonc de Jacquin. — Jacquin's Rush.

Pentes humides de la région sous alpine et alpine. Juin — Août.





452. *Juncus triglumis*, L. — Dreispelzige Simse.

Jonc triflore. — Threeflowered Rush.

Lieux humides de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.







453. *Juncus alpinus*, Vill. — Alpen-Simse.

Jonc des Alpes. — Alpine Rush.

Pentes humides de la région sous alpine et alpine. Juillet — Septembre.





454. *Juncus Hostii* Tausch. — Host's Simse.

Jonc de Host. — Host's Rush.

Rochers et lieux frais des alpes calcaires. Juin—Août.






455. *Luzula spicata* DC. — Ährenblüthige Hainsimse.

Luzule en épis. — Spiked Woodrush.

Prairies de la région sous alpine et montagneuse. Juin — Août.





456. *Luzula flavescens* Gaud. — Gelbliche Hainsimse.  
Luzule jaunâtre. — Yellowish Woodrush.

Lieux boisés de la région montagnaise. Mai — Juillet.







457. *Luzula lutea* DC. — Gelbe Hainsimse.

*Luzule* jaune. — Yellow Woodrush.

Pentes gazonnées des Alpes granitiques dans la région alpine et sous alpine. Juin — Août.





458. *Luzula nivea* DC. — Schneeweisse Hainsimse.  
Luzule blanche. — Snowwhite Woodrush.

Lieux boisés des Alpes calcaires. Juin — Juillet.





**459.** *Heleocharis pauciflora*, Lk. — Wenigblüthige Sumpfbirse.  
Héléochare pauciflore. — Fewflowering Heleocharis.

Tourbières et lieux marécageux des basses régions. Mai — Aout.






460. *Eriophorum Scheuchzeri*, Hoppe. — Scheuchzer's Wollgras.

Line aigrette de Scheuchzer. — Scheuchzer's Cottongrass.

Tourbières des Alpes. Mai — Juillet.







461. *Eriophorum atrichum* Palla. — Borstenloser Zwergriet.

Linaigrette chauve. — Bald Cottongrass.

Alpes méridionales et tyroliennes dans les marécages et près des sources de la région alpine et sous alpine. Juillet — Août.





462. *Eriophorum alpinum*, L. — Alpen-Wollgrass.

Linaigrette des Alpes. — Alpine Cottongrass.

Tourbières des Alpes. Mai—Aout.





463. *Kobresia scirpina*, Willd. — Hüllsegge.

Kobrésie Scirpe. — Scirpuslike Kobresia.

Pentes rocheuses et sèches de la région alpine et sous alpine (ici et là). Juin — Août.





464. *Kobresia caricina*, Willd. — Jochsegge.

Kobrésie divisée. — Divided Kobresia.

Pâturages et pentes herbeuses rocailleuses de la région alpine. Juin — Août.








465. *Carex atrata*, L. — Schwarze Segge.  
Laiche noire. — Dark Sedge.

Prairies humides et escarpements frais des Alpes. Juin — Août





466. *Carex capillaris*, L. — Zartstielige Seege.  
Laiche capillaire. — Capillary Sedge.  
Marécages et lieux humides des Alpes. Juin — Août.





467. *Carex firma*, Host. — Feste Segge.

Laiche fermé. — Firm Sedge.

Pâturages rocheux de la région alpine et sous alpine. Juin — Août.





468. *Carex ferruginea*, Scop. — Rostbraunè Segge.  
Laiche ferrugineuse. — Ironlike Sedge.

Rocailles et pâturages pierreux de la région alpine et sous alpine. — Juin--Août.







469. *Phleum alpinum*, L. — Alpen-Lieschgras.  
Phléole des Alpes. — Alpine Cat's-tail.  
Prairies et pâturages des Alpes. Juin — Septembre.





**470.** *Agrostis alpina*, Scop. — Alpenwindhalm.

*Agrostis des Alpes*. — Alpine *Agrostis*.

Pâturages et diluvions pierreuses des Alpes. Juillet—Septembre.





471. *Trisetum subspicatum*, Beauv. — Ährenrispiger Goldhafer.

Canche en épis. — Spicate Trisetum.

Pierriers et rochers des Alpes granitiques. Juillet — Août.





472. *Trisetum alpestre*, Beauv. — Alpen-Goldhafer.  
*Trisetum alpestre*. — Alpine *Trisetum*.

Lieux pierreux des Alpes. Juillet—Août.







473. *Avena versicolor*, Vill. — Bunter Hafer.  
Avoine bigarrée. — Steaked Oat.

Pâturages et pentes rocheuses des Alpes. Juillet—Août.





474. *Sesleria ovata*, A. Kern. — Kleinähriges Kopfgras.

Seslérie à petits épis. — Ovate Sesleria.

Fentes des rochers dans les Alpes orientales. Juillet — Août.





475. *Sesleria varia*, Wettst. — Buntes Kopfgras.  
Seslérie bigarrée. — Sheaked Sesleria.

Clairières et rochers des régions supérieures de la chaîne alpine. Avril—Juillet.





476. *Sesleria disticha* Pers. — Zweizeiliges Berggras.

Seslérie distique. — Distish Sesleria.

Rochers des Alpes. Juillet—Août.







477. *Köleria hirsuta*, Gaud. — Rauhaariges Schillergras.

Keulérie hérissée. — Hirsute Koeleria.

Lieux rocaillieux de la région alpine et sous alpine. Juillet — Août.





478. *Poa alpina*, L. — Alpen-Rispengras.

Pâturin des Alpes. — Poa.

Prairies et pâturages des régions inférieures. Mai — Août. La variété vivipara offre des fleurs transformées en bourgeons feuillés.





479. *Posa cenisia*, All. — Mont Cenis-Rispengras.

Pâturin du Mont Cenis. — Mount Cenis's Poa.

Escarpements rocheux et herbeux des Alpes. Juillet—Août.






480. *Festuca pulchella*, Schrad. — Schöner Schwingel.

Fétuque gracieuse. — Pleasant Fescue.

Rochers et pierrailles des Alpes. Juin — Août.







481. *Festuca pumila*, Vill. — Zwergschwingel.

Petite Fétuque. — Little Fescue.

Rochers et pâturages rocailleux des Alpes. Juillet — Août.





482. *Festuca Halleri*, All. — Haller's Schwingel.  
Fétuque de Haller. — Haller's Fescue.

Escarpements des Alpes. Juillet — Août.





483. *Nardus stricta*, L. — Borstengras.

Herbe des Chamois. — Matgrass.

Pentes sèches des hautes régions. Juillet—Août.





484. *Pinus Cembra*, L. — Zirbelkiefer (Arve).  
Arole. — Alpine Pine.

Région boisée supérieure, zone sous alpine et alpine. Juin.







485. *Pinus montana*, Mill. — Legföhre, Krummholz.

Torche pin. — Mountain Fir.

Dans les pentes rocailleuses de la région sous alpine. Juin — Juillet.





486. *Juniperus nana*, Willd. — Zwerg-Wachholder.

Genièvre nain. — Dwarf Juniper.

Pentes herbeuses et rocheuses de la région alpine et sous alpine. Mai—Juillet.





487. *Juniperus Sabina*, L. — Sevenbaum.  
Sabine des Alpes. — Alpine Savin.

Pentes chaudes de la région sous alpine et montagnaise. Avril—Juin.






488. *Taxus baccata*, L. — Eibe.

If commun. — Common Yew.

Disséminé dans la chaîne alpine. Avril — Mai.







489. *Botrychium Lunaria*, Sw. — Gemeine Mondraute.  
Lunaire. — Moonwort.

Pâturages des Alpes.





490. *Blechnum Spicant*, Sm. — Rippenfarn.  
*Blechnum commune*. — Hard Fern.  
 Disséminé le long de la chaîne alpine.





491. *Asplenium viride*, Huds. — Grünstieliger Milzfarn.

Doradille verte. — Green Spleenwort.

Escarpelements frais et moussus de la chaîne alpine.





492. *Asplenium Seelosii*, Leyb. — Seelos' Milzfarn.

Doradille de Seelos. — Seelos's Lady Fern.

Dolomites du Tyrol et des Alpes orientales dans les fentes des rochers de la zone alpine et sous-alpine. Juillet — Août.







493. *Aspidium Lonchitis*, Sw. — Sichelarn.

Fougère à l'épine. — Holly Fern.

Bois pierreux de la chaîne alpine, surtout dans le calcaire.





494. *Adiantum Capillus Veneris*, L. — Frauenhaar.  
Cheveux de Vénus. — Maidenhair,  
Grottes et fentes des rochers calcaires des Alpes méridionales.





495. *Cryptogramme crispa*, R. Br. — Rollfarn.

Allosore crépu. — Parsleyfern.

Pierriers des Alpes granitiques dans la région alpine. Abüt. — Septembre





496 *Scolopendrium vulgare*, Sm. — Hirschzunge.

Langue de Cerf. — Hartstongue.

Lieux boisés et rocheux des régions inférieures surtout calcaires.







497. *Cystopteris fragilis*, Bernh. — Blasenfarn.  
Cystoptère des murailles. Brittle Bladder Fern.

Rochers, murailles et lieux humides. Juin — Septembre.






498. *Woodsia hyperborea*, R. Br. — Nordischer Steintarn.  
Woodsie hyperboréenne. Hyperborean Woodsia.

Disséminé dans la région alpine et sous alpine dans les fentes des rochers granitiques. Août—Septembre.





199. *Lycopodium alpinum*, L. — Alpen-Bärlapp.  
Lycopode alpin. — Savin leaved Club-moss.  
Pâturages et pentes humides des Alpes. Juillet — Septembre.






500. *Lycopodium selaginoides*, L. — Gezähntblättriger Moosbärlapp  
Sélaginelle alpine. — Prickly mountain moss.

Pâturages humides et frais des Alpes.









New York Botanical Garden Library

QK 315 .C58 v.t 5

Correvo, Henry/Atlas de la flora alpine gen



3 5185 00108 2492



